

	<b>Pédiatrique Pellegrin</b> <b>Émetteur : Service des Urgences Pédiatriques</b>	<b>IN-PRM-019</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	Ind : 01 Page : 1/1
<b>Antibiothérapie et infections osteoarticulaires</b>		

Protocole établi à partir des recommandations faites par la commission transversale des antibiotiques du CHU de Bordeaux.

Ces recommandations sont établies pour le traitement de 1<sup>ère</sup> intention des infections communautaires.

Ces recommandations :

- sont à moduler en cas d'infection grave
  - sont à moduler chez les enfants ayant déjà reçu un traitement > 48 h
  - sont à réévaluer systématiquement après 72 h
1. Enfant sans facteur de risque :
    - CLOXACILLINE : 150 mg/kg/j en 4 fois IVL 1 heure pendant 7 jours
    - Associée à
    - GENTAMICINE : 3 mg/kg/j en 1 fois IVL 1 heure pendant 7 jours
    - Relais per os en fonction du germe et du type d'infection (ostéoarthrite ou ostéomyélite) : avis spécialisé
  2. Enfant drépanocytaire, asplénique, non vacciné haemophilus/pneumocoque :
    - CEFOTAXIME : 150 mg/kg/J EN 4 fois IVDL pendant 7 jours
    - Associée à
    - FOSFOMYCINE : 150 mg/kg/j en 3 perfusions de 4 heures pendant 7 jours
    - Relais per os en fonction du germe et du type d'infection (ostéoarthrite ou ostéomyélite) : avis spécialisé